

Люби, живи и будь ответственной!

Врач дерматовенеролог
Стерляева Е.А.





Mons Pubis

Clitoral Hood

Clitoral Glans


Labia Minora


Labia Majora


Vagina

Pernineum

Anus







Женская половая система

ИППП ?!

Аббревиатура ИППП означает:

Инфекции

Передаваемые

Половым

Путем



Зачем тебе знать об ИППП?

Все люди ведут половую жизнь.

Значит заболеть может
каждый из 6,5 млрд людей,
живущих на земле.

Чем для тебя опасны ИППП ?

- Воспалением половых органов
- Бесплодием
- Инвалидностью
- И даже смертельным исходом!

Много или мало ?

- По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно **в мире** регистрируется более **340 млн** новых случаев заболевания;
- **В России** более **1 млн** человек болеют ИППП. **В реальности эти цифры в 2,5 раза больше** – не все пока обратились в врачу.

В России у **34%** молодых людей в
возрасте от 16 до 21 года
выявили ИППП.



Почему это касается именно
тебя?



- 14 – 19 лет это возраст сексуального дебюта;
- Это возраст наибольшей сексуальной активности;
- Может быть у тебя недостаточно информации о возможных рисках;
- Или мало опыта;
- Внешне болезнь может быть незаметна.

Ты пока ищешь свою любовь?

Ходишь на дискотеки, тусуешься с друзьями, знакомишься, флиртуешь?



Ты держишь ситуацию под контролем?



Алкоголь и наркотики ослабляют контроль за ситуацией!

Твои планы и
намерения не
заниматься сексом
могут быть
нарушены.



Незащищенный секс

– повод обратиться к
врачу дерматологу и гинекологу,
ведь болезнь может начинаться
без симптомов!



Думаешь,
что тебя не касается,
ПОТОМУ ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ЭТО
"по - быстренькому" или
нетрадиционно?

Возбудители этих инфекций с одинаковым удобством обитают на половых органах, во рту и в кишечнике.

Это означает, что при любом виде сексуальных отношений вы рискуете инфицироваться!

А может все таки "простыла" или
ветром надуло?



**ИППП передаются половым
путем!**

Они очень быстро погибают вне
человеческого тела и в большинстве
случаев **не передаются** через
посторонние предметы!

В настоящее время известно
более 30 болезней.

Наиболее распространенные:

- Сифилис;
- Гонорея (триппер);
- Трихомониаз;
- Генитальный герпес;
- Кондиломы.




Ты знаешь самую
распространенную?



Это трихомониаз.

- **Причина** – трихомонады (простейшие микроорганизмы);
- **Обитают** во влажной среде (в моче, в сперме);
- Первые 5-15 дней никак себя не проявляет;
- Затем появляется **зуд во влагалище**;



Симптомы:

- Обильные пенистые выделения из половых путей с неприятным рыбным запахом;
- Боли внизу живота, боли при мочеиспускании;
- Нарушение мочеиспускания.




Последствия:


- Без лечения не покидает организм человека;
- Способен вызывать тяжелые осложнения от сепсиса до бесплодия.



Что такое хламидиоз?



- Причина – бактерии;
- Симптомы
появляются через 7-30 дней после заражения;
- Необильные прозрачные выделения, напоминающие клей;
- Слабые боли при мочеиспускании и внизу живота



Последствия хламидийной инфекции

- Инфекция распространяется по всему организму, так же могут поражаться кишечник, глаза, органы дыхания, суставы;
- Внематочная беременность, выкидыши, хронические тазовые боли и бесплодие.




Рис. 3. Трахома



Гонорея (триппер)

- Причина – бактерии;
- Поражает шейку матки, прямую кишку, мочеиспускательный канал, горло и глаза;
- Симптомы появятся через 2 недели после заражения, иногда может протекать бессимптомно.



- Зеленоватые или желтоватые **выделения** из влагалища;
- Ощущение **жжения** при мочеиспускании;
- **Зуд** и/или **выделения** из анального отверстия;
- **Боль** внизу живота;
- **Кровянистые** выделения из половых путей.



Гонорея




Выделения из влагалища при гонорее.

Последствия:

- Бесплодие и/или
внематочная
беременность;
- Во время
беременности
гонорея может
передаться ребенку
и привести его к
слепоте.



Сифилис



- это заразное заболевание, которое поражает все органы и ткани человека;
- Вызывается микробом-бледной спирохетой;
- В клинике выделяют 4 периода;
- Течение волнообразное;



Инкубационный период

- Бледная спирохета внедряется в кожу или слизистую оболочку половых органов, рта, заднего прохода (в зависимости от выбранного вида сексуальной активности);
- В течение **3 - 4 недель** никаких **признаков** заболевания **не обнаруживается**, даже в **крови**.

Первичный период

- Примерно **через месяц** в месте проникновения бледной спирохеты появляется язвочка - **твердый шанкр**.
- Анализ крови становится **«положительный»**



Вторичный сифилис

- Через 2-2,5 месяца после заражения на коже и слизистых оболочках появляются различные **высыпания**: пятна, узелки, гнойнички;
- Они содержат **большое количество бледной трепонемы** и поэтому **очень заразны для контактирующих лиц**;
- Может наблюдаться выпадение волос.










Б

Третичный сифилис



Генитальный герпес



Остроконечные кондиломы



Девочки, Внимание!

- Почему девочки подвергаются большему риску заболеть?



В силу биологических особенностей
организма, у девушек намного
меньше защитных антител.

Незрелость шейки матки
увеличивает риск развития болезни!

- Иногда девушки **не способны убедить** старшего по возрасту партнера пользоваться презервативами;



- Девушки чаще поддаются уговорам и подвергаются половому насилию!

По статистике, 1/3 девочек заражаются ИППП в момент сексуального дебюта

Если вы не чувствуете симптомов,
но побывали в такой ситуации
возможно вы заболели!

Бегом к врачу!

Но обычно происходит так:

- «Авось пройдет!»



- Поищу в интернете...



- Спрошу у подруги



- Вылечусь сама!

Твоя болезнь исчезла?

В подавляющем большинстве случаев
болезнь переходит в **хроническую форму**
с частыми обострениями и тяжелыми
осложнениями

Поможет врач!



Почему самолечение неразумно и рискованно?

- Один и тот же препарат может дать **разный результат: что помогло одному, навредит другому!**
- Венерические болезни **редко встречаются в одиночку...** Вылечив одну из них можно выработать стойкий иммунитет у других к этому лекарству;
- О некоторых тонкостях вы **не прочтете в ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ.** Их можно услышать только на приеме у врача.

Куда обращаться?

1. с. Малая Пурга, ул. Пионерская 51, МУЗ «Малопургинская ЦРБ», каб. 110;

Ежедневно с 8.00 до 16.12., кроме субботы и воскресенья. Обед с 12.00 до 13.00

тел. 4-14-95 (регистратура)

2. г. Ижевск, ул. Сабурова 41, подростковый центр «Доверие».

Ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

тел. 8 (3412) 21-04-89

Что ждет тебя у врача?

- Лечить ИППП нужно срочно, чтобы предотвратить осложнения;
- Для лечения ИППП применяется 1-2 лекарства;
- Длительность лечения составляет от 10 до 20 дней;
- Необходимо строго соблюдать назначения врача;

Что ждет тебя у врача?

- Лечиться нужно **одновременно со своим сексуальным партнером**;
- После курса лечения оба партнера должны сдать анализ, чтобы узнать, что вы точно здоровы;
- До этого избегайте незащищенных сексуальных контактов!

Как позаботиться о себе?



Лучший партнер – любимый,
постоянный, единственный!

Прежде чем вступать в сексуальные
связи, реши для себя, сможешь ли ты
поговорить с партнером о безопасности.

Если нет, то лучше вообще воздержаться
от половых контактов.

Не позволяй никому принимать
решение за тебя!

Если ты опасаясь секса или считаешь что
тебе рано пока об этом думать –
воздержись от секса!

Ты решила, что готова к
сексуальным отношениям?

Всегда пользуйтесь
презервативом!

Даже один раз может оказаться роковым!

Как выбрать презерватив?

- Презерватив должен быть качественным, известной марки;
- Поэтому лучше покупать презервативы в аптеках;
- Проверьте срок годности и целостность упаковки;
- Вскрывать презерватив следует руками;
- Хранить НЕ в холодильнике, и НЕ под прямыми солнечными лучами.



**Контекс гель-смазка
Грин антибактериальная
30мл**



Благодарю за внимание!

